

化学療法レジメン集 (膠原病)

薬剤-03

第 1.0 版

2023 年 1 月 25 日

八潮中央総合病院

薬剤部

内容

1. リウマチ	1
1.1 CPA 単独療法.....	1
1.2 Tocilizumab 単独療法.....	2

1. リウマチ

1.1 CPA 単独療法

癌化学療法登録プロトコル

届出日：H30.9.3

診療科：内科	医師氏名：竹之下 拓					
【対象疾患】 治療抵抗性リウマチ性疾患	【レジメン名（略称）】 CPA 単独療法					
【薬品名・用法・用量】 4 週間毎						
〇〇日目	投与時間	1	2	3	...	28
Rp:1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg	30 分	○				
Rp:2 デキサート 9.9mg 生食 50ml	15 分	○				
Rp:3 エンドキサン 50~1000mg/m ² 5%ブドウ糖 250ml	120 分	○				
Rp:4 生理食塩水 50ml	フラッシュ用	○				
Rp:5 デカドロン錠 4 mg 2 錠 2× p.o.	朝・昼食後		○	○		
Rp:6 レバミピド錠 100 3 錠 3× p.o.	毎食後		○	○		
【備考・注意等】 ・ 中等度（催吐性）リスク シクロホスファミド (<1,500 mg/m ²) ・ 下痢に注意 デカドロン(4mg) 2 錠 1× Day2,3 p.o.						
【出典・文献等】 Pulse cyclophosphamide for severe neuropsychiatric lupus. Q J 1991 Dec81(296):975-84						

化学療法レジメン集	第 3.0 版	文書番号 薬剤-03	頁 2/3
-----------	---------	---------------	----------

1.2 Tocilizumab 単独療法

癌化学療法登録プロトコル

届出日：2019.4.1

診療科：膠原病内科	医師氏名：竹之下 拓							
【対象疾患】 関節リウマチ	【レジメン名（略称）】 Tocilizumab 単独療法							
【薬品名・用法・用量】 トシリズマブ 8mg/kg Day1 4週間毎								
〇〇日目	投与時間	1	・	8	・	15	・	29
Rp:1 生理食塩液 100ml div	プライミング &フラッシュ用	○						○
Rp:2 アクテムラ点滴静注用 8mg/kg 生理食塩液 250ml div *B.W.25kg 以下の場合は生理食 塩液 50ml	60分	○						○
【備考・注意等】 投与禁忌：活動性結核を含む重篤な感染症に合併している患者 ・ 明らかな活動性を有している感染症を保有する患者においては、その種類に関係なく感染症の治療を優先し、感染症の治癒を確認後に本剤の投与を行う。本剤は、CRPなどの炎症マーカーや、発熱などの症状を著明に抑制するため、感染症の悪化を見過ごす可能性がある。 ・ 慢性活動性EBウイルス感染(CAEBV)を伴う関節リウマチ患者にトシリズマブの投与がなされ、その急激な悪化により死亡した症例の報告 ⁶ があり、CAEBVを伴う患者への本剤の投与は避ける。								
【出典・文献等】 関節リウマチ（RA）に対するIL-6阻害薬使用ガイドライン(2018年8月14日改訂版)								

化学療法レジメン集	第 3.0 版	文書番号 薬剤-03	頁 3/3
-----------	---------	---------------	----------