

带状疱疹予防ワクチンを希望される方へ

◆ 予約方法

お電話にて承ります。薬剤の準備等ございますのでご連絡頂いてから接種まで 1 週間ほどお時間を頂いております。予約の際に、希望するワクチンをお申し付け下さい。

◆ 予防ワクチンの違いについて

2 種類のワクチンが存在します。新しく発売されましたシングリックスの方が、予防効果は高い反面、副反応がやや多いことや費用が高いことが挙げられます。

その他の違いについては以下をご参照下さい。

	ビケン(水痘ワクチン) ※従来のもの	シングリックス
種類	弱毒生ワクチン	不活化ワクチン
推奨	60 歳以上の方 (50 歳以上も可能)	50 歳以上の方 免疫抑制を伴う治療を行う予定のある方 軽度の免疫抑制療法を受けている方
接種方法	皮下注射	筋肉注射
接種方法	1 回	合計 2 回 : 2 ヶ月空けて * 最長 6 か月空けて接種可
带状疱疹発症予防効果	約 50%	約 90%以上
带状疱疹後疼痛予防効果	約 67%	約 90%以上
予防効果の持続期間	5 年程度 接種後 7~8 年で 21~32% 9~11 年以降は期待できない	9 年程度 接種後 3 年間は 97.2%
特徴的な禁忌	妊婦、免疫不全患者 (ステロイドや免疫抑制剤使用中の患者など)	
副反応	注射部位の痛みや腫れ、倦怠感 (3~7 日以内)	注射部位の痛みや腫れ、倦怠感、頭痛、震え、胃腸症状など(3~7 日以内) 水痘ワクチンに比べてやや副反応強い。
価格	安い ¥11,000	高い ¥22,000 × 2
他ワクチンとの接種間隔	● 1 ヶ月空けて	● 接種間隔に制限なし ● 新型コロナワクチンとは 2 週間空けて